arXiv:1405.0571v1 [math.CA] 3 May 2014

Наближення сумами Зигмунда класів згорток періодичних функцій в інтегральних метриках

У. З. Грабова
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Анотація

We obtain estimates exact in order for deviations of Zygmund sums in metrics of spaces L_q, $1 < q < \infty$, on classes of 2π-periodic functions, that admit the representation in the form of convolution of functions that belong to unit ball of the space L_1 with fixed kernel Ψ_β. We show that at certain values of the parameters that define the class $L^{\psi}_{\beta,1}$ and method of approximation, Zygmund sums provide the order of best approximation of given classes by trigonometric polynomials in metric L_q.

Получены точные по порядку оценки отклонений сумм Зигмунда в метриках пространств L_q, $1 < q < \infty$, на классах 2π-периодических функций, которые допускают изображение в виде свертки функций, принадлежащих единичному шару пространства L_1 с фиксированным ядром Ψ_β. Показано, что при определенных значениях параметров, что определяют класс $L^{\psi}_{\beta,1}$ и метод приближения, суммы Зигмунда обеспечивают порядок наилучшего приближения указанных классов тригонометрическими полиномами в метрике L_q.

Нехай L_p, $1 \le p \le \infty$, — простір 2π-періодичних сумовних функцій φ зі скінченною нормою $\|\varphi\|_p$, де при $p \in [1,\infty)$ $\|\varphi\|_p := \Big(\int\limits_0^{2\pi} |\varphi(t)|^p dt\Big)^{\frac{1}{p}}$, а при $p = \infty$ $\|\varphi\|_\infty := \operatorname{ess\,sup}\limits_t |\varphi(t)|$.

Нехай, далі, $L^{\psi}_{\beta,p}$, $1 \le p < \infty$, — клас 2π-періодичних функцій $f(x)$, що майже для всіх $x \in \mathbb{R}$ представляються згортками

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + (\Psi_\beta * \varphi)(x) := \frac{a_0}{2} + \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \Psi_\beta(x-t)\varphi(t)dt,\ a_0 \in \mathbb{R},\ \varphi \perp 1, \tag{1}$$

де $\|\varphi\|_p \le 1$, а $\Psi_\beta(t)$ — сумовне на $[0, 2\pi)$ ядро, ряд Фур'є якого має вигляд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \psi(k)\cos\Big(kt - \frac{\beta\pi}{2}\Big),\ \psi(k) > 0,\ \beta \in \mathbb{R}.$$

Функцію φ в зображенні (1) називають (ψ,β)-похідною функції f і позначають через f^{ψ}_{β}. Поняття (ψ,β)-похідної належить О.І. Степанцю (див., наприклад, [1, с. 132]).

Якщо $\psi(k) = k^{-r}$, $r > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$, то класи $L^{\psi}_{\beta,p}$ є класами Вейля-Надя і позначаються через $W^{r}_{\beta,p}$.

Не зменшуючи загальності можна вважати, що послідовність $\psi(k)$, яка визначає класи згорток, є слідом на множині натуральних чисел $\mathbb{N}$ деякої неперервної функції $\psi(t)$ неперервного аргументу $t \geq 1$.

Позначимо через Θ_ϱ, $1 \leq \varrho < \infty$, множину монотонно незростаючих функцій $\psi(t)$, $t \geq 1$, для яких існує стала $\alpha > \frac{1}{\varrho}$ така, що функція $t^\alpha \psi(t)$ майже спадає, тобто для будь-яких $t_1 > t_2 \geq 1$ виконується нерівність $t_1^\alpha \psi(t_1) \leq K t_2^\alpha \psi(t_2)$, в якій K — деяка додатна стала. Прикладами функцій ψ, що задовольняють умову $\psi \in \Theta_\varrho$ є, зокрема, функції вигляду $\psi_1(t) = \frac{1}{t^r}$, $r > \frac{1}{\varrho}$; $\psi_2(t) = \frac{\ln^\alpha(t+c)}{t^r}$, $r > \frac{1}{\varrho}$, $\alpha > 0$, $c > e^{\frac{2\alpha}{r-\frac{1}{\varrho}}} - 1$; $\psi_3(t) = \frac{1}{t^r \ln^\alpha(t+c)}$, $r > \frac{1}{\varrho}$, $\alpha > 0$, $c > 0$; $\psi_4(t) = \frac{\ln\ln^\alpha(t+c)}{t^r}$, $r > \frac{1}{\varrho}$, $\alpha > 0$, $c > e^{\frac{2\alpha}{r-\frac{1}{\varrho}}} - 1$.

У даній роботі будемо вимагати, щоб $\psi \in \Theta_{q'}$, $\frac{1}{q} + \frac{1}{q'} = 1$, $1 < q < \infty$. Умова $\psi \in \Theta_{q'}$, як неважко переконатись, гарантує справедливість включення $\Psi_\beta \in L_q$ (див., наприклад, [2, с. 657]), а отже, і вкладення $L^\psi_{\beta,1} \subset L_q$, $1 < q < \infty$ (див., наприклад, нерівність (1.5.28) із роботи [3, с. 43]).

Сумами Зигмунда функції f із L_1 називають тригонометричні поліноми вигляду

$$Z^s_{n-1}(f;t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \left(\frac{k}{n}\right)^s\right)(a_k \cos kt + b_k \sin kt), s > 0, \tag{2}$$

де a_k і b_k — коефіцієнти Фур'є функції f. При $s = 1$ поліноми Z^s_{n-1} є відомими сумами Фейєра, які позначаються через $\sigma_{n-1}(f;t)$.

В даній роботі досліджуються величини

$$\mathcal{E}\left(L^\psi_{\beta,p}; Z^s_{n-1}\right)_q = \sup_{f \in L^\psi_{\beta,p}} \|f(\cdot) - Z^s_{n-1}(f;\cdot)\|_q,$$

з метою одержання для них точних порядкових оцінок, при $\psi \in \Theta_{q'}$, $\beta \in \mathbb{R}$, $s > 0$, $1 < q < \infty$ і $p = 1$.

В роботі також розглядатимуться найкращі наближення класів $L^\psi_{\beta,p}$, $p \geq 1$, $\beta \in \mathbb{R}$ тригонометричними поліномами t_{n-1} порядку $n-1$, тобто величини вигляду

$$E_n\left(L^\psi_{\beta,p}\right)_q = \sup_{f \in L^\psi_{\beta,p}} \inf_{t_{n-1}} \|f(\cdot) - t_{n-1}(\cdot)\|_q, \ 1 \leq p, \ q \leq \infty,$$

за умови, що $L^\psi_{\beta,p} \subset L_q$. Далі буде вказано область допустимих значень параметрів ψ, s і q при яких порядки спадання величин $\mathcal{E}\left(L^\psi_{\beta,1}; Z^s_{n-1}\right)_q$ і $E_n\left(L^\psi_{\beta,1}\right)_q$ збігаються.

Вивченню апроксимативних властивостей сум Зигмунда на різних функціональних класах присвячена значна кількість робіт (з детальною бібліографією з цього напряму можна ознайомитись в [4]). Зокрема, у [4] знайдено порядкові оцінки величин $\mathcal{E}\left(L^\psi_{\beta,p}; Z^s_{n-1}\right)_\infty$ при $\psi \in \Theta_p$, $1 < p < \infty$ і $\beta \in \mathbb{R}$.

Порядки спадання величин $E_n\left(L^\psi_{\beta,p}\right)_q$ досліджувались багатьма авторами (див. [5, 6] та ін.). У [6] встановлено точні порядкові рівності величин $E_n\left(L^\psi_{\beta,1}\right)_q$, $1 < q \leq \infty$, за умови, що $\psi \in \Theta_{q'} \cap B$, $\frac{1}{q} + \frac{1}{q'} = 1$ і $\beta \in \mathbb{R}$, де B — множина монотонно незростаючих функцій $\psi(t)$, для кожної з яких можна вказати додатну сталу K таку, що $\frac{\psi(t)}{\psi(2t)} \leq K$, $t \geq 1$.

Дана робота є продовженням досліджень, розпочатих у [4] та [6]. Для формулювання основних результатів введемо наступні означення.

Будемо казати, що додатна функція $g(t)$, задана на $[1,\infty)$, належить до множини A^+ ($g\in A^+$), якщо існує $\varepsilon>0$ таке, що $g(t)t^{-\varepsilon}$ зростає на $[1,\infty)$. Якщо існує $\varepsilon>0$ таке, що $g(t)t^{\varepsilon}$ спадає на $[1,\infty)$, то будемо казати, що g належить до множини A^- ($g\in A^-$). Через $\mathcal{Z}$ позначимо множину неперервних слабо коливних (в сенсі Зигмунда) функцій, тобто додатних функцій $g(t)$, визначених на $[\frac{1}{\pi},\infty)$, таких, що при довільному $\delta>0$ для достатньо великих t $g(t)t^{\delta}$ зростає, а $g(t)t^{-\delta}$ спадає.

Далі під записом $A(n)=O(B(n))$ розумітимемо, що існує стала $K>0$, така, що виконується нерівність $A(n)\le K(B(n))$, для всіх $n\in\mathbb{N}$. Запис $A(n)\asymp B(n)$ означає, що $A(n)=O(B(n))$ і одночасно $B(n)=O(A(n))$.

Теорема 1. *Нехай* $1<q<\infty$, $s>0$, $n\in\mathbb{N}$, $g_{s,q'}(t):=\psi(t)t^{s+\frac{1}{q'}}$, $\frac{1}{q}+\frac{1}{q'}=1$ *і* $\beta\in\mathbb{R}$. *Тоді*

1. Якщо $\psi\in\Theta_{q'}$ *і* $g_{s,q'}\in A^+$, *то*

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};Z^{s}_{n-1}\big)_q=O\big(\psi(n)n^{1-\frac{1}{q}}\big). \tag{3}$$

2. Якщо $g_{s,q'}\in\mathcal{Z}$, *то*

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};Z^{s}_{n-1}\big)_q=O\left(\frac{1}{n^s}\Big(\int\limits_1^n\frac{\big(g_{s,q'}(t)\big)^q}{t}dt\Big)^{\frac{1}{q}}\right). \tag{4}$$

3. Якщо $g_{s,q'}\in A^-$, *то*

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};Z^{s}_{n-1}\big)_q=O\big(n^{-s}\big). \tag{5}$$

Доведення. З рівностей (1) та (2) випливає, що для будь-якої $f\in L^{\psi}_{\beta,1}$ майже для всіх $x\in\mathbb{R}$ має місце рівність

$$f(x)-Z^{s}_{n-1}(f;x)=\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\Big(\frac{1}{n^s}\sum_{k=1}^{n-1}\psi(k)k^s\cos\Big(k(x-t)-\frac{\beta\pi}{2}\Big)+\Psi_{\beta,n}(x-t)\Big)\varphi(t)dt, \tag{6}$$

де $\|\varphi\|_1\le 1$, $\Psi_{\beta,n}(\tau)=\sum\limits_{k=n}^{\infty}\psi(k)\cos\Big(k\tau-\frac{\beta\pi}{2}\Big)$, $\quad n\in\mathbb{N}$.

Із (6), застосовуючи нерівність (1.5.28) з роботи [3, с. 43] та нерівність трикутника, отримуємо

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};Z^{s}_{n-1}\big)_q\le\frac{1}{\pi n^s}\Big\|\sum_{k=1}^{n-1}\psi(k)k^s\cos\Big(k(\cdot)-\frac{\beta\pi}{2}\Big)\Big\|_q+\frac{1}{\pi}\big\|\Psi_{\beta,n}(\cdot)\big\|_q.$$

Тоді, скориставшись формулами (18), (21), (24) та (42) з роботи [4], одержимо оцінки (3)–(5). Теорему 1 доведено.

Теорема 2. *Нехай* $1<q<\infty$, $s>0$, $n\in\mathbb{N}$, $g_{s,q'}(t):=\psi(t)t^{s+\frac{1}{q'}}$, $\frac{1}{q}+\frac{1}{q'}=1$ *і* $\beta\in\mathbb{R}$. *Тоді*

1. Якщо $\psi\in\Theta_{q'}$, $g_{s,q'}\in A^+$ *і функція* $1/\psi(t)$ *опукла вгору або донизу на* $[1,\infty)$, *то*

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};Z^{s}_{n-1}\big)_q\asymp E_n\big(L^{\psi}_{\beta,1}\big)_q\asymp\psi(n)n^{1-\frac{1}{q}}. \tag{7}$$

2. Якщо $g_{s,q'} \in \mathcal{Z}$, *то*

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1}; Z^{s}_{n-1}\big)_q \asymp \frac{1}{n^s}\Big(\int\limits_{1}^{n} \frac{\big(g_{s,q'}(t)\big)^q}{t}dt\Big)^{\frac{1}{q}}. \tag{8}$$

3. Якщо $g_{s,q'} \in A^{-}$, *то*

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1}; Z^{s}_{n-1}\big)_q \asymp n^{-s}. \tag{9}$$

Доведення. Оцінки зверху для величин $\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1}; Z^{s}_{n-1}\big)_q$ в (7) – (9) випливають із співвідношень (3) – (5) відповідно.

Розглянемо випадок $g_{s,q'} \in A^{+}$, $\psi \in \Theta_{q'}$. У роботі [6, с. 1195], при $\psi \in \Theta_{q'} \cap B$, $1 < q \leq \infty$, $\frac{1}{q} + \frac{1}{q'} = 1$, за умови, що функція $1/\psi(t)$ опукла вгору або донизу на $[1, \infty)$, встановлено наступну оцінку знизу для величини $E_n(L^{\psi}_{\beta,1})_q$:

$$E_n(L^{\psi}_{\beta,1})_q \geq K_{\psi,q}\psi(n)n^{1-\frac{1}{q}}, \ n \in \mathbb{N}, \ \beta \in \mathbb{R}, \tag{10}$$

де $K_{\psi,q}$ — додатна величина, що може залежати лише від ψ та q. Оскільки з включення $g_{s,q'} \in A^{+}$, $s > 0$, $1 < q \leq \infty$ випливає, що $\psi \in B$, то з оцінок (3), (10) та нерівності $E_n(L^{\psi}_{\beta,1})_q \leq \mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1}; Z^{s}_{n-1}\big)_q$, $n \in \mathbb{N}$ випливає порядкова рівність (7).

Нехай, далі, $g_{s,q'} \in \mathcal{Z}$. Для встановлення оцінки знизу величини $\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1}; Z^{s}_{n-1}\big)_q$, $1 < q < \infty$ розглянемо функцію

$$\varphi_{\alpha}(t) = \varphi_{\alpha}(n,t) = \alpha\Big(V_n(t) - \frac{1}{2}\Big), \ \alpha > 0, \ n \in \mathbb{N},$$

де $V_m(t)$ — ядра методу Валле Пуссена,

$$V_m(t) := \frac{1}{m}\sum_{k=m}^{2m-1} D_k(t) = D_m(t) + 2\sum_{k=m+1}^{2m-1}\Big(1 - \frac{k}{2m}\Big)\cos kt, \ m \in \mathbb{N},$$

$D_k(t)$ — ядра Діріхле, $D_k(t) := \frac{1}{2} + \sum\limits_{\nu=1}^{k}\cos \nu t = \frac{\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)t}{2\sin\frac{t}{2}}$, $k \in \mathbb{N}$.

Оскільки (див., наприклад, [6, с. 1192]) $|V_m(t)| < A_1 m$, $0 \leq t \leq \pi$, $|V_m(t)| \leq \frac{A_2}{mt^2}$, $0 < t \leq \pi$, де A_i — абсолютні сталі, то нескладно переконатися, що

$$\|\varphi_{\alpha}\|_1 \leq \alpha\big(\pi + \|V_n\|_1\big) \leq \alpha A_3. \tag{11}$$

При $\alpha = \alpha_0 = A_3^{-1}$ з (11) одержуємо нерівність $\|\varphi_{\alpha_0}\|_1 \leq 1$.

Із [7, с. 65] випливає, що для функції $f_{\alpha_0}(t) := (\varphi_{\alpha_0} * \Psi_{\beta})(t)$ має місце рівність

$$f_{\alpha_0}(t) = \alpha_0\Big(\sum_{k=1}^{n}\psi(k)\cos\Big(kt - \frac{\beta\pi}{2}\Big) + 2\sum_{k=n+1}^{2n-1}\psi(k)\Big(1 - \frac{k}{2n}\Big)\cos\Big(kt - \frac{\beta\pi}{2}\Big)\Big). \tag{12}$$

Розглянемо інтеграл

$$I := \int\limits_{-\pi}^{\pi}\Big(f_{\alpha_0}(t) - Z^{s}_{n-1}(f_{\alpha_0}; t)\Big)\sum_{k=1}^{n-1}\frac{\big(\psi(k)k^{s+\frac{1}{q'}}\big)^{q-1}}{k^{\frac{1}{q}}}\cos\Big(kt - \frac{\beta\pi}{2}\Big)dt.$$

Враховуючи (12), (2) та відому формулу

$$\int\limits_{-\pi}^{\pi}\cos\Big(kt-\frac{\beta\pi}{2}\Big)\cos\Big(mt-\frac{\beta\pi}{2}\Big)dt=\begin{cases}0, & k\neq m,\quad k,m\in\mathbb{N},\quad \beta\in\mathbb{R},\\ \pi, & k=m,\quad k,m\in\mathbb{N},\quad \beta\in\mathbb{R},\end{cases}$$

інтеграл I можна записати у вигляді $I=\frac{\alpha_0\pi}{n^s}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\frac{\left(\psi(k)k^{s+\frac{1}{q'}}\right)^q}{k}$, звідки одержуємо

$$I\cdot\left(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{\left(\psi(k)k^{s+\frac{1}{q'}}\right)^q}{k}\right)^{-\frac{1}{q'}}=\frac{\alpha_0\pi}{n^s}\left(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{\left(\psi(k)k^{s+\frac{1}{q'}}\right)^q}{k}\right)^{\frac{1}{q}}\geq\frac{K^{(1)}_{\psi,s,q}}{n^s}\left(\int\limits_1^n\frac{\left(g_{s,q'}(t)\right)^q}{t}dt\right)^{\frac{1}{q}},\tag{13}$$

тут і далі $K^{(i)}_{\psi,s,q}$ — додатні величини, що можуть залежати тільки від ψ, s та q.

З іншого боку, для оцінки зверху величини I застосуємо нерівність Гельдера та проведемо міркування, використані при доведенні формули (42) з роботи [4], внаслідок чого отримуємо, що при $1<q<\infty$

$$I\leq\Big\|f_{\alpha_0}(t)-Z^s_{n-1}(f_{\alpha_0};t)\Big\|_q\left\|\sum_{k=1}^{n-1}\frac{(g_{s,q'}(k))^{q-1}}{k^{\frac{1}{q}}}\cos\Big(kt-\frac{\beta\pi}{2}\Big)\right\|_{q'}\leq$$

$$\leq K^{(2)}_{\psi,s,q}\Big\|f_{\alpha_0}(t)-Z^s_{n-1}(f_{\alpha_0};t)\Big\|_q\Big(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{(g_{s,q'}(k))^q}{k}\Big)^{\frac{1}{q'}},\ \frac{1}{q}+\frac{1}{q'}=1.\tag{14}$$

Об'єднуючи (13) та (14) будемо мати

$$\frac{K^{(1)}_{\psi,s,q}}{n^s}\left(\int\limits_1^n\frac{\left(g_{s,q'}(t)\right)^q}{t}dt\right)^{\frac{1}{q}}\leq I\cdot\left(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{\left(g_{s,q'}(k)\right)^q}{k}\right)^{-\frac{1}{q'}}\leq K^{(2)}_{\psi,s,q}\Big\|f_{\alpha_0}(t)-Z^s_{n-1}(f_{\alpha_0};t)\Big\|_q.\tag{15}$$

З (15) отримуємо

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};Z^s_{n-1}\big)_q\geq\Big\|f_{\alpha_0}(t)-Z^s_{n-1}(f_{\alpha_0};t)\Big\|_q\geq\frac{K^{(3)}_{\psi,s,q}}{n^s}\left(\int\limits_1^n\frac{\left(g_{s,q'}(t)\right)^q}{t}dt\right)^{\frac{1}{q}}.$$

Оцінку знизу величини $\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};Z^s_{n-1}\big)_q$ у випадку $g_{s,q'}\in\mathcal{Z}$, $1<q<\infty$ доведено.

Як випливає з теореми (2.2.1) роботи [1, с. 92], метод Z^s_{n-1} насичений з порядком насичення n^{-s}, тобто величини $\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};Z^s_{n-1}\big)_q$ не можуть прямувати до нуля швидше за порядком, ніж n^{-s}, звідки випливає, що для довільного $\beta\in\mathbb{R}$, $1<q<\infty$, за умови $g_{s,q'}\in A^-$, виконується порядкова рівність (9). Теорему 2 доведено.

Наслідок 1. *Нехай* $1<q<\infty$, $n\in\mathbb{N}$, $g_{1,q'}(t):=\psi(t)t^{1+\frac{1}{q'}}$, $\frac{1}{q}+\frac{1}{q'}=1$ *і* $\beta\in\mathbb{R}$. *Тоді*

1. Якщо $\psi\in\Theta_{q'}$, $g_{1,q'}\in A^+$ *і функція* $1/\psi(t)$ *опукла вгору або донизу на* $[1,\infty)$, *то*

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};\sigma_{n-1}\big)_q\asymp E_n\big(L^{\psi}_{\beta,1}\big)_q\asymp\psi(n)n^{1-\frac{1}{q}}.$$

2. Якщо $g_{1,q'} \in \mathcal{Z}$, *то*

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};\sigma_{n-1}\big)_q \asymp \frac{1}{n}\Big(\int\limits_1^n \frac{\big(g_{1,q'}(t)\big)^q}{t}dt\Big)^{\frac{1}{q}}.$$

3. Якщо $g_{1,q'} \in A^-$, *то*

$$\mathcal{E}\big(L^{\psi}_{\beta,1};\sigma_{n-1}\big)_q \asymp n^{-1}.$$

Наслідок 2. *Нехай* $r > 1-\frac{1}{q}$, $1 < q < \infty$, $s > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}\backslash\{1\}$. *Тоді*

$$\mathcal{E}\left(W^r_{\beta,1};Z^s_{n-1}\right)_q \asymp \begin{cases} n^{-(r-1+\frac{1}{q})}, & 1-\frac{1}{q} < r < s+1-\frac{1}{q}; \\ n^{-s}\ln^{\frac{1}{q}} n, & r = s+1-\frac{1}{q}; \\ n^{-s}, & r > s+1-\frac{1}{q}. \end{cases} \tag{16}$$

При $s = 1$ із (16) випливають результати одержані А.І. Камзоловим [8]. Із (16) і теореми 3.6 роботи [9, с. 47] випливає, що при $1-\frac{1}{q} < r < s+1-\frac{1}{q}$ і $\beta \in \mathbb{R}$

$$\mathcal{E}\left(W^r_{\beta,1};Z^s_{n-1}\right)_q \asymp E_n\left(W^r_{\beta,1}\right)_q \asymp n^{-(r-1+\frac{1}{q})}, \quad 1 < q < \infty.$$

1. *Степанец А.И.* Методы теории приближений: В 2 ч. // Праці Інституту математики НАН України. — 2002. — Т. 40. — Ч. 1. — 427 с.

2. *Бари Н.К.* Тригонометрические ряды. — М.: Физматгиз, 1961. — I. — 936 с.

3. *Корнейчук Н.П.* Точные константы в теории приближения. — М.: Наука, 1987. — 423 с.

4. *Сердюк А.С., Грабова У.З.* Оцінки рівномірних наближень сумами Зигмунда на класах згорток періодичних функцій // Теорія наближення функцій та суміжні питання: Зб. праць Ін-ту матем. НАН України. — Київ: Ін-т математики НАН України, 2013. — **10**, №1. — С. 222–244.

5. *Степанец А.И.* Методы теории приближений: В 2 ч. // Праці Інституту математики НАН України. — Киев: Ин-т математики НАН Украины. 2002. — **40**. — Ч.II. — 468 с.

6. *Грабова У.З., Сердюк А.С.* Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур'є класів (ψ,β)-диференційовних функцій // Укр. мат. журн. — 2013. — **65** , №9. — С. 1186–1197 .

7. *Зигмунд А.* Тригонометрические ряды. В 2 т. — М.: Мир, 1965. — Т.I. — 615 с.

8. *Камзолов А.И.* О приближении классов функций $\widetilde{W}^{\alpha}_{p}(L)$ методом Фейера в пространствах $L_s[-\pi,\pi]$ // Мат. заметки. — 1978. — **23**, №3. — С. 343–349.

9. *Temlyakov V.N.* Approximation of periodic function. — Nova Sci. Publ., 1993. — 419 p.